



# ALBIT PLUS

## Regulamento de uso

Atualizada: **03.06.20**



# ALBIT PLUS

**ADUBO FOLIAR PARA AUMENTAR  
A PRODUÇÃO E QUALIDADE DA COLHEITA**

### COMPOSIÇÃO GARANTIDA

Azoto (N) total .....	9,90 %
Azoto nítrico .....	0,60 %
Azoto amoniacal .....	2,20 %
Azoto ureico .....	5,50 %
Azoto orgânico .....	1,60 %
Fosfato (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) total .....	7,70 %
Potássio solúvel em água (K <sub>2</sub> O) total .....	5,60 %
Ácidos húmicos total .....	5,70 %
Matéria orgânica total .....	26,00 %

#### Componentes orgânicos:

Massa de agulhas de coníferas .....	0,08 %
Extrato de agulhas de coníferas .....	7,90 %

**\*Não contém microrganismos vivos**

**ADUBO ORGANOMINERAL  
NK FLUÍDO 10-5 LÍQUIDO**

pH: 5,4

**INÓCUO E NÃO TÓXICO PARA OS SERES  
HUMANOS, PLANTAS E ABELHAS**

### CARACTERÍSTICAS

O ALBIT PLUS® aumenta o rendimento e a qualidade da

Cultivo	Dose de ALBIT	Modo e momento de aplicação	Número de tratamentos
Algodão	<b>Tratamento de sementes</b>		
	100 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	Se as sementes já vierem tratadas e não for possível aplicar tratamentos adicionais, poder-se-á adicionar ALBIT a outros produtos quando se leva a cabo o tratamento localizado em linhas durante a sementeira. A dose é de 100 cc/ha.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos: 1 – na fase de 3-5 folhas implantadas; 2 – na fase do surgimento dos botões florais; 3 – 10-15 dias após o segundo tratamento.	1-3	
Arroz	<b>Tratamento de sementes</b>		
	100 cc/Tn de sementes	<b>Sementeira de sementes secas</b> Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	200 cc/Tn de sementes	<b>Pré-germinação de sementes</b> Antes da sementeira, molhar as sementes durante 8-48 horas na solução de ALBIT com água.	1
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de perfilhamento.	1-2	
Beterraba sacarina	<b>Tratamento de sementes</b>		
	100 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 5-6 folhas visíveis, e depois em intervalos de 10-20 dias, até ao final da fase de início de cobertura do cultivo.	2-3	



<b>Canola</b>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	50 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de 1-3 entrenós perceptíveis; 2 – na fase de surgimento de botões florais.	1-2
<b>Cereais</b>  Aveia, Cevada, Centeio, Painço, Sorgo, Trigo, Trigo sarraceno, Triticale, Quinoa.	<b>Tratamento de sementes</b>		
	100 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas. Pode reduzir-se a dose de fungicidas em até 50%.	1
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de perfilhamento; 2 – entre as fases de encanamento e folha bandeira.	1-2
<b>Citrinos</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores em plena produção</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de brotamento; 2 – na fase de florescimento; 3 – no início do crescimento do fruto; 4 – na fase em que o fruto alcança 50% do seu tamanho final; 5 – no início da maturação.	4-5
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores recém-plantadas</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-

<b>Cucurbitáceas</b>  Abóbora, Melão, Melancia.	<b>Tratamento de sementes</b>		
	2 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Utilizar um dos seguintes modos de aplicação:  - Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água; - Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-5 folhas verdadeiras do tronco principal, e depois em intervalos de 10-20 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4	
<b>Estacas</b>	1 cc / 1 L de água	Antes da plantação, molhar as estacas durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1
<b>Flores cortadas</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	1-2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 15 dias, a partir da fase de 2-3 folhas verdadeiras do tronco principal e até que a planta alcance a produção plena com a dose de <b>2,5 cc / 10 L</b> de água, e depois pode aplicar-se a dose reduzida, de <b>1-1,5 cc / 10 L</b> de água, até que termine a campanha.	-



<p><b>Frutos secos</b></p> <p>Amêndoa, Avelã, Bolota, Castanha, Noz, Noz pecã, Pistácio.</p>	<b>Tratamento foliar</b>		
	200-250 cc/ha	<p><b>Árvores em plena produção</b></p> <p>Tratar con una mezcla de ALBIT y otros productos fitosanitarios en los siguientes momentos:</p> <p>1 – en la fase de floración; 2 – no início do crescimento do fruto; 3 – na fase em que o fruto alcança 50% do seu tamanho final; 4 – em pós-colheita.</p>	3-4
	2,5 cc / 10 L de água	<p><b>Árvores recém-plantadas</b></p> <p>Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.</p>	-
	<b>Programa especial para proteger contra as geadas</b>		
125 cc/ha	Tratar com a solução de ALBIT apenas com água, ou de ALBIT com outros produtos fitossanitários 2-3 dias antes das geadas, e depois repetir 1-2 dias após as geadas.	2	
<p><b>Frutas de caroço</b></p> <p>Ameixa, Cereja, Damasco, Nectarina, Paráguai, Pêssego.</p>	<b>Tratamento foliar</b>		
	<b>Programa geral para aumentar a produtividade das árvores em plena produção</b>		
	200-250 cc/ha	<p>Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos.</p> <p>1 – en la fase de floración; 2 – no início do crescimento do fruto; 3 – na fase em que o fruto alcança 50% do seu tamanho final; 4 – no início da maturação; 5 – em pós-colheita.</p>	4-5
	<b>Programa especial para aumentar o calibre dos frutos e o conteúdo de açúcares</b>		
	200-250 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários 50-60 dias antes da colheita, e depois em intervalos de 10-15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	3-4
	<b>Programa especial para proteger contra as geadas</b>		
125 cc/ha	Tratar com a solução de ALBIT apenas com água, ou de ALBIT com outros produtos fitossanitários 2-3 dias antes das geadas, e depois repetir 1-2 dias após as geadas.	2	



	<b>Programa geral para estimular o desenvolvimento de árvores recém-plantadas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
	<b>Tratamento foliar</b>		
	<b>Programa geral para aumentar a produtividade das árvores em plena produção</b>		
	200-250 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – en la fase de floración; 2 – no início do crescimento do fruto; 3 – na fase em que o fruto alcança 50% do seu tamanho final; 4 – no início da maturação; 5 – em pós-colheita.	4-5
	<b>Programa especial para incrementar el calibre de los frutos y el contenido de azúcares</b>		
	200-250 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários 50-60 dias antes da colheita, e depois em intervalos de 10-15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	3-4
	<b>Programa especial para proteger contra as geadas</b>		
	125 cc/ha	Tratar com a solução de ALBIT apenas com água, ou de ALBIT com outros produtos fitossanitários 2-3 dias antes das geadas, e depois repetir 1-2 dias após as geadas.	2
	<b>Programa geral para estimular o desenvolvimento de árvores recém-plantadas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
	<b>Tratamento foliar</b>		
		<b>Árvores em plena produção</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – en la fase de floración; 2 – no início do crescimento do fruto;	
<b>Frutas de semente</b>  Kiwi, Maçã, Marmelo, Nêspira, Pera.	2,5 cc / 10 L de água		3-4
<b>Frutos vermelhos</b>  Amora Framboesa, Groselha, Mirtilos.	2,5 cc / 10 L de água		3-4



<b>Frutos vermelhos</b>  Amora Framboesa, Groselha, Mirtilos.		3 – na fase em que o fruto alcança 50% do seu tamanho final; 4 – no início da maturação.	
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores recém-plantadas</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
<b>Fungos</b>	2 cc / 1 L de água	Vários dias após a sementeira de micélio, verter 20 ml da solução de ALBIT com água e outros produtos fitossanitários por cada 1 kg da embalagem.	1
<b>Girassol</b>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	500 cc/Tn de sementes	Tratar as sementes com a solução de ALBIT e água e deixá-las de molho durante 2-3 horas antes da sementeira.	1
	<b>Recomendações:</b>	Se as sementes já vierem tratadas e não for possível aplicar tratamentos adicionais, poder-se-á adicionar ALBIT a outros produtos quando se leva a cabo o tratamento localizado em linhas durante a sementeira. A dose é de 100 cc/ha.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	1 – no surgimento de 4-7 folhas implantadas; 2 – no início da formação da cabeça (ou no último momento quando é possível entrar na superfície para realizar o tratamento).	1-2
<b>Recomendações:</b>	No case de não se ter realizado o primeiro tratamento de ALBIT e os herbicidas, dever-se-á aplicar a dose de 100 cc/ha de ALBIT durante o segundo tratamento.		
<b>Hortaliças de bolbos</b>  Alho, Alho francês, Cebola, Cebolinha, Chalota.	<b>Tratamento de sementes</b>		
	1 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento de dentes</b>		
	100-200 cc/Tn de dentes	Antes da sementeira, tratar os dentes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas ou ALBIT apenas com água.	1
<b>Tratamento de plântulas</b>			
2,5 cc / 10 L de água	Utilizar um dos seguintes modos de aplicação:  - Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT	1	



<b>Hortaliças de bolbos</b>  Alho, Alho francês, Cebola, Cebolinha, Chalota.		e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água; - Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.	
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 10-20 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	3-4
<b>Hortaliças de flores</b>  Alcachofra, Brócolos, Couve-flor, Romanesco.	<b>Tratamento de sementes</b>		
	1 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Utilizar um dos seguintes modos de aplicação: - Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água; - Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4	





<b>Hortalizas de frutos</b>  Aboborinha, Beringela, Pepino, Pimento, Tomate.	<b>Tratamento de sementes</b>		
	2 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Utilizar um dos seguintes modos de aplicação:  - Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água; - Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
	<b>Hortalizas industriais</b>		
	1 <sup>er</sup> y 2 <sup>o</sup> – 50 cc/ha 3 <sup>er</sup> – 80 cc/ha 4 <sup>o</sup> – 100 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4
<b>Hortalizas de mesa</b>			
1-2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 15 dias, a partir da fase de 2-3 folhas verdadeiras do tronco principal e até que a planta alcance a produção plena com a dose de <b>2,5 cc / 10 L</b> de água, e depois pode aplicar-se a dose reduzida, de <b>1-1,5 cc / 10 L</b> de água, até que termine a campanha.	-	
<b>Hortalizas de folhas</b>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	1 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1

<p><b>Hortaliças de folhas</b></p> <p>Acelga, Alface, Chicória, Couve de bruxelas, Couve lombarda, Endívia, Espinafres, Repolho, Salsa.</p>	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	<p>Utilizar um dos seguintes modos de aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água;</li> <li>- Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.</li> </ul>	1
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4
<p><b>Hortaliças de raíz</b></p> <p>Beterraba de mesa, Cenoura, Nabo, Rábano.</p>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	2 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	<p>Utilizar um dos seguintes modos de aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água;</li> <li>- Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.</li> </ul>	1
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
<b>Tratamento foliar</b>			
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4	



<p><b>Hortaliças de troncos e talos</b></p> <p>Aipo, Borragem, Cardo, Espargos.</p>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	2 cc/kg de sementes	Antes da sementeira, molhar as sementes durante 10 horas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Utilizar um dos seguintes modos de aplicação:  - Submergir a bandeja com plantas na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água; - Antes do transplante, tratar as plantas em bandeja por via foliar com uma solução de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	O primeiro modo de aplicação de ALBIT é preferível, porque se consegue a melhor penetração do produto até às raízes das plantas.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4	
<p><b>Hortaliças de tubérculos</b></p> <p>Batata, Batata-doce.</p>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	100 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar os tubérculos com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	Se as sementes já vierem tratadas e não for possível aplicar tratamentos adicionais, pode adicionar-se ALBIT a outros produtos quando se leva a cabo o tratamento localizado em linhas durante a sementeira.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários entre a fase de início de cobertura do cultivo, e a fase de surgimento dos botões florais, e depois em intervalos de 10-15 dias, até um máximo de 4 tratamentos.	2-4	



<b>Leguminosas</b>  Amendoins, Ervilhas, Favas, Feijão verde, Grão de bico, Lentilhas, Lupino, Soja.	<b>Tratamento de sementes</b>		
	50-100 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	No caso de utilizar ALBIT durante a inoculação de sementes com as bactérias fixadoras de nitrogénio, recomenda-se a aplicação da dose de 100 cc/Tn. As sementes tratadas devem ser armazenadas não mais do que 1 dia antes da sementeira.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de 3-4 folhas visíveis, e depois em intervalos de 15-20 dias, até um máximo de 3 tratamentos.	2-3
<b>Lúpulo</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase da altura da planta entre 2-2,5 metros, e depois em intervalos de 25-35 dias, até um máximo de 3 tratamentos.	1-3
<b>Milho</b>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	100 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1
	<b>Recomendações:</b>	Se as sementes já vierem tratadas e não for possível aplicar tratamentos adicionais, poder-se-á adicionar ALBIT a outros produtos quando se leva a cabo o tratamento localizado em linhas durante a sementeira. A dose é de 50-100 cc/ha.	
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de surgimento de 3-6 folhas visíveis; 2 – duas semanas depois do primeiro tratamento (ou no último momento quando é possível entrar na superfície para realizar o tratamento).	1-2
<b>Morangos</b>	<b>Tratamento de plântulas</b>		
	1 cc / 1 L de água	Antes da plantação, humedecer as raízes das plantas vários segundos na solução de ALBIT e os fungicidas, ou de ALBIT apenas com água.	1



<b>Morangos</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	1-2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 15 dias, a partir da fase de 2-3 folhas verdadeiras do tronco principal e até que a planta alcance a produção plena com a dose de <b>2,5 cc / 10 L</b> de água, e depois pode aplicar-se a dose reduzida, de <b>1-1,5 cc / 10 L</b> de água, até que termine a campanha.	-
<b>Oliveira</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores em plena produção</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de brotamento; 2 – na fase de florescimento; 3 – na fase de queda da flor/engorda; 4 – em pós-colheita.	3-4
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores recém-plantadas</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
<b>Outras árvores</b>  Banana, Carambola, Caqui, Figo, Tâmara, e outros.	<b>Tratamento foliar</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores em plena produção</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de brotamento; 2 – na fase de florescimento; 3 – no início do crescimento do fruto; 4 – no início da maturação; 5 – em pós-colheita.	3-5
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores recém-plantadas</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
<b>Plantas forrageiras</b>	<b>Tratamento de sementes</b>		
	50 cc/Tn de sementes	Antes da sementeira, tratar as sementes com uma mistura de ALBIT com os fungicidas, ou de ALBIT só com água.	1



<b>Plantas forrageiras</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	50 cc/ha e 75 cc/ha	A dose de 50 cc aplica-se na fase de brotamento. A dose de 75 cc aplica-se 7-10 dias após cada corte.	-
<b>Plantas ornamentais e cultivos florestais</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a partir da fase de formação de botões florais (surgimento das folhas nas plantas que não florescem), e depois em intervalos de 15 dias, até um máximo de 3 tratamentos	2-3
<b>Relva</b>	<b>Tratamento foliar</b>		
	1 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 30 dias.	-
	<b>Recomendações:</b>	No caso de ser necessário recuperar a relva após ter sido danificada, recomenda-se que aumenta a dose até 2,5 cc / 10 L de água. Com o sistema de rega, recomenda-se a utilização da dose de 100 cc/ha.	
<b>Subtropicais</b>  Abacate, Ananás, Anona, Manga, Papaia.	<b>Tratamento foliar</b>		
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores em plena produção</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – na fase de brotamento; 2 – na fase de florescimento; 3 – no início do crescimento do fruto; 4 – na fase em que o fruto alcança 50% do seu tamanho final.	3-4
	2,5 cc / 10 L de água	<b>Árvores recém-plantadas</b> Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
<b>Tabaco</b>	<b>Tratamiento durante la siembra</b>		
	100 cc/ha	Tratar nos sulcos durante a sementeira ou plantação com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários, ou de ALBIT apenas com água.	1
	<b>Tratamento foliar</b>		
	50-75 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários durante os primeiros tratamentos foliares.	2-3

<b>Tratamiento foliar</b>		
<b>Programa geral para aumentar a produtividade das árvores em plena produção</b>		
2,5 cc / 10 L de água <b>Dose mínima – 125 cc/ha</b>	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários nos seguintes momentos. 1 – quando os troncos alcançarem 10-15 cm; 2 – na queda da flor; 3 – 30 dias após o segundo; 4 – 30 dias antes da colheita.	3-4
<b>Programa especial para aumentar o conteúdo de açúcares</b>		
2,5 cc / 10 L de água <b>Dose mínima – 125 cc/ha</b>	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários 60 dias antes da colheita, e depois em intervalos de 15-20 dias, até um máximo de 3 tratamentos.	3
<b>Programa especial para minimizar gastos reduzindo as doses de fungicidas a 50%: enquanto se começa a aplicar ALBIT, reduzir a dose de fungicidas a 50%; até então, é necessário aplicar a dosagem completa</b>		
200 cc/ha	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários quando os troncos alcançarem 10-15 cm, e depois em intervalos de 20 dias, até um máximo de 5 tratamentos.	4-5
<b>Programa especial para proteger contra as geadas</b>		
125 cc/ha	Tratar com a solução de ALBIT apenas com água, ou de ALBIT com outros produtos fitossanitários 2-3 dias antes das geadas, e depois repetir 1-2 dias após as geadas.	2
<b>Programa geral para estimular o desenvolvimento de árvores recém-plantadas</b>		
2,5 cc / 10 L de água	Tratar com uma mistura de ALBIT e outros produtos fitossanitários a cada 20-40 dias durante o período vegetativo.	-
<b>Recomendações:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Com o sistema de nebulização, para todos os programas a dose é de 200 cc/ha.</li> <li>2. Para recuperar a uva após o granizo, a dose é de 200 cc/ha.</li> <li>3. No caso de se utilizarem os produtos para deter o desenvolvimento das uvas de mesa, dever-se-ão realizar os tratamentos com ALBIT apenas antes da queda da flor e depois da fase em que as uvas tenham alcançado o seu tamanho final.</li> </ol>		



#### Recomendações adicionais:

1. Para os cultivos herbáceos, a dose é de 50-75 cc por hectare. Recomenda-se a aplicação da dose de 75 cc por hectare no caso de haver oportunidade de realizar apenas 1 tratamento foliar com ALBIT, ou no caso de se necessário aumentar a resistência das plantas nas zonas nas quais que estão sujeitas a muito stress hídrico e térmico. A dose de 50 cc por hectare é utilizada nas zonas que estão sujeitas a menos stress hídrico e térmico ou quando se aplica ALBIT como um potenciador numa mistura com os produtos estimulantes de crescimento à base de aminoácidos, extrato de algas ou outros componentes.
2. Para os cultivos lenhosos, no caso de aplicar ALBIT numa mistura com os produtos estimulantes do crescimento baseados em aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, extrato de algas e outros componentes, poder-se-á reduzir a dose de ALBIT para 50%, mantendo a dose mínima de 125 cc/ha.
3. No caso de não serem possíveis os tratamentos foliares com ALBIT durante as fases mais importantes do desenvolvimento da planta, poder-se-ão levar a cabo tratamentos com a rega por gota com a dose de 150-250 cc/ha.
4. Para recuperar a planta após o granizo e a sobredosagem de produtos fitossanitários e fertilizantes, recomenda-se proceder sem demora com o tratamento foliar de ALBIT empregando as seguintes doses:
  - Para os herbáceos, a dose é de 100 cc/ha (o dobro da dose normal);
  - Para as plantas perenes, a dose é de 200-250 cc/ha (dose completa).